



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

بیمارستان کودکان حکیم
Hakim Children Hospital



جهت دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر این بارکد را اسکن نمایید



021-67648000

www.hch.tums.ac.ir

یافت آباد، خیابان شهید رجایی، میدان امام علی (ع)، خیابان عمرانی

بیماری کاوازاکی



تهیه و تنظیم:

سیدعلیرضا اسلامبولی زاده

منبع:

سوپروایزر آموزشی به بیمار


پرستاری کودکان وونگ

در صورت درد قلب، گرفتگی قفسه سینه، اندام های سرد و رنگ پریده، درد شکم، تهوع و استفراغ و بی قراری شدید بایستی به پزشک مراجعه کنید.

چند نکته در هنگام مصرف آسپرین:

مصرف آسپرین فقط با دستور پزشک می باشد از مصرف خودسرانه آن خودداری کنید. اگر کودک شما حین مصرف آسپرین در معرض بیماری آنفلونزا یا ابله مرغان قرار گرفت یا به این بیماری ها مبتلا شد. بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. در صورت علائم مسمومیت با آسپرین، شامل سر گیجه و سردرد، ووز گوش، کبودی بی دلیل، خون در استفراغ، خلط خونی و خون در مدفوع به پزشک مراجعه کنید.

با انجام آزمایشات و معاینات بعدی که پزشک برای کودکان تجویز می کند به شما و پزشک کمک می کند تا در مورد نبود مشکلات قلبی مطمئن شوید.



• یک بیماری نادر دوران کودکی است .

• معمولاً کودکان زیر ۵ سال رادرگیری کند .

• در پسران شایع است .

• در اواخر زمستان و بهار بیشتر دیده می شود .

• این بیماری ارثی نمی باشد ، قابل پیشگیری نیست و قابل سرایت به دیگران نمی باشد.



تعریف کاوازاکی:

بیماری با علت ناشناخته می باشد که باعث التهاب عروق خونی) بخصوص عروق کوچک و متوسط(در سرتا سر بدن می شود.

علت ایجاد بیماری ناشناخته است ولی احتمال می دهند منشاء عفونی داشته باشد و بدنبال افزایش پاسخ سیستم دفاعی بدن یا پاسخ ، نامناسب آن به عوامل عفونی)ویروس ها و باکتریها (باشد که این پاسخ نامناسب باعث التهاب عروق خونی سراسر بدن و تخریب عروق خونی می شود.

علائم بیماری چیست؟

تب مداوم بالای ۳۹ درجه سانتیگراد که به آنتی بیوتیک جواب نداده و بیش از ۵ روز طول بکشد. قرمزی هردو چشم ، ورم و قرمزی کف دستها و کف پاها که دردناک نیز می باشد. دانه های قرمز رنگ روی پوست شکم سینه و دستگاه تناسلی ، ورم کردن غدد لنفاوی گردن که دردناک نیز بوده و یک طرفه می باشد.



خشکی و ترک خوردگی لبها، قرمزی ورم زبان و سفید شدن و برآمدگی های بزرگ روی زبان(زبان توت فرنگی.)

تشخیص: تشخیص این بیماری مشکل می باشد زیرا هیچ گونه آزمایشی برای تشخیص آن وجود ندارد در صورت وجود نشانه های زیر تشخیص کاوازاکی داده می شود. کودک شما برای بیش از ۵ روز تب داشته باشد . کودک شما حداقل ۴ مورد از علائم که قبلاً ذکر شده را داشته باشد. انجام آزمایش خون و ادرار نیز معمولاً انجام می شود.

درمان:

همه کودکان مبتلا به کاوازاکی بایستی در بیمارستان بستری شوند و درمان شامل:

* **تزریق ایمنوگلوبولین داخل وریدی** (این دارو ، به بدن کمک می کند تا با عفونت مبارزه کند و التهاب رگهای خونی را کاهش می دهد).

* **آسپرین** که به کاهش تب و درد کمک می کند و خطر احتمالی لخته شدن خون را کاهش می دهد.

* استفاده از **آنتی اسید**.

بیماری، باتشخیص و درمان زودهنگام کوتاه تر شده و احتمال ایجاد مشکلات قلبی را کاهش می دهد.

آموزش به والدین:

از رژیم غذایی نرم و مایعات که خیلی سرد و گرم نباشد استفاده کنید. سعی کنید کاری کنید که کودکان بیش از حد خسته نشود. ممکن است پوست او برای یک ماه یا بیشتر خشک شود، از لوسیون مخصوص کودکان برای مرطوب نگه داشتن پوست استفاده کنید. درد مفاصل تا چند هفته ادامه دارد از تزریق واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده تا ۱۱ ماه پس از دریافت ایمنوگلوبولین وریدی خودداری کنید.

در صورت تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد در منزل به پزشک اطلاع دهید.